

## Suporte Básico de Vida Adulto

### MANTER SBV

Mantenha as manobras de reanimação (30 compressões alternando com 2 insuflações) até:

- Chegar ajuda diferenciada;
- Ficar exausto;
- A vítima retomar sinais de vida

#### Avaliar as Condições de Segurança:

Reanimador,  
Vítima  
e Terceiros



#### Avaliar o Estado de Consciência



#### Permeabilizar a Via Aérea



#### Avaliar a Respiração: Ver, Ouvir e Sentir



#### Ligar 112



#### Realizar Compressões

**Torácicas:** 30 compressões  
(100 a 120  
por minuto)



#### Realizar 2 insuflações, após as 30 compressões



#### NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

ALTERAÇÕES NA ABRIGAGEM A VÍTIMA EM  
PARAGEM CARDIORRESPIRATÓRIA

**NÃO EXECUTAR O VER, OUVIR E SENTIR**  
VERIFICAR SINAIS DE VIDA POR MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS OU TONÁRIS

**COBRIR BOCA E NARIZ DA VÍTIMA**  
COM FASCIA CÍRURGICA OU PANO

**NÃO FAZER VENTILAÇÕES**

**MANTER COMPRESSÕES ININTERRUPTAS**

TELA DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ANÁLISE, CHEQUE DE CALIBRE

PROTEJA-SE